

## Exame de vínculo genético em aves

**Solicitante: Francisco Martins Melo**

**Espécie: *Oryzoborus angolensis***

Os testes realizados analisam diversos locos ou regiões do DNA conhecidos como microssatélites ou STRS (*ShortTandemRepeats* ou *Repetições Curtas em Tandem*). O DNA é amplificado pela reação em cadeia da polimerase (PCR), utilizando kits e reagentes internacionais de qualidade comprovada. É utilizado então o sequenciador para identificação dos alelos ou marcadores de cada loco genético.

Locus	Limeira SLC 113 035973	054859 / Atena 859
Bio 01	135/155	135/155
Bio 02	178/194	194/214
Bio 03	229/233	225/233
Bio 04	245/261	x
Bio 05	157/173	173/189
Bio 06	289/317	313/317
Bio 07	201/205	197/201
Bio 08	236/251	236/254
Bio 09	169/169	169/181
Bio 10	303/315	303/315
Bio 11	244/248	x
Bio 12	215/220	230/230


- A coleta do material analisado e sua identificação são de responsabilidade do solicitante. O resultado se fundamenta na identificação correta da amostra biológica de cada animal.

- É possível ocorrerem animais geneticamente semelhantes devido ao alto grau de retrocruzamentos. Mesmo com um teste de alto poder de exclusão, podem aparecer resultados inconclusivos, ou ainda, a conclusão de paternidade/maternidade pode surgir também para animais de descendência direta. Para casos como o descrito é sugerida a realização de exame que incluam suposto pai, mãe e filho afim de melhor esclarecimento.

### Conclusão:

Não foi possível excluir a hipótese da existência de maternidade entre as amostras **Limeira SLC 113 035973** e **054859 Atena 859**.

Goiânia, 12 de Setembro de 2024



Dra. Alessandra M. TomasuloSeccomandi  
Doutora em Genética e Evolução  
Diretora Técnica  
CRBio 44498/04-D